

Protocolo P = Antiparasitario

Este protocolo no es una simple desparasitación, fue diseñado especialmente para casos en los que las desparasitaciones convencionales no funcionan.

Está orientado en contra de parásitos de gran tamaño, como los ascaris y adherencias resistentes con protozoos. (eh? parásitos pequeños de microscopio)

Al realizar este protocolo es habitual expulsar gran cantidad de "mucosas", que resultan difíciles de identificar. Como las que estáis viendo, son curiosas ya que no son solubles en agua.

Según las investigaciones parece ser un biofilm o magma parasitario que utilizan los parásitos intestinales pequeños para protegerse de agresiones externas y reproducirse en un ambiente mas propicio para ellos.

Es un protocolo especialmente útil en caso de:

- Enfermedades crónicas sin solución aparente.
- Autismo.
- Diabetes.
- Enfermedades autoinmunes.
- Etcétera...

¿Cómo se hace?

Es un protocolo muy específico y debe seguirse día a día para obtener los resultados deseados.

Para los enemas:

- De 10 a 20 ml de CDS concentrado, disueltos en 2litros de agua.
- Como alternativa sirve también 10 a 20 gotas activadas de CD, disueltas en 2litros de agua.
- Estas cantidades irán en función de peso y gravedad de la enfermedad

- **Día 1:**
 - Pamoato de Pirantel: (dosis única mañana) 10 mg/kg,
En forma líquida: 60 kg = 3 veces 5ml.
En comprimidos: 3 pastillas para 60 Kg.
 - Tierra de diatomeas: (2 dosis) Una cucharadita de postre con comidas.

- **Día 2:**
 - Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y otra de noche.
 - Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con comidas.
 - Enema.

- **Día 3:**
 - Aceite de Ricino: dos cucharadas soperas en ayunas.
 - Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y otra de noche.
 - Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con comidas.
 - Enema.

- **Día 4:**
 - Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y otra de noche.
 - Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con comidas.
 - Enema.

- **Día 5:**
 - Pamoato de Pirantel: (dosis única mañana) 10 mg/kg,
En forma líquida: 60 kg = 3 veces 5ml.
En comprimidos: 3 pastillas para 60 Kg.
 - Tierra de diatomeas: (2 dosis) Una cucharadita de postre con comidas.
 - Enema.

- **Día 6:**
 - Aceite de Ricino: dos cucharadas soperas en ayunas.
 - Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y otra de noche.
 - Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con

comidas.

- Enema.

- **Día 7:**

- Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y otra de noche.

- Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con comidas.

- Enema.

- **Día 8:**

- Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y otra de noche.

- Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con comidas.

- Enema.

- **Del 9 al 18 (Primer mes):**

- Aceite de Ricino: dos cucharadas soperas en ayunas. Suprimir en caso de diarrea continua.

- Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con comidas.

- Infusión de Neem (Azadirachta Indica) Tres cucharaditas rasas de té en un litro de agua. Hervir durante 5 minutos e ir tomando durante el día.

- Enemas de la manera más continuada posible (máx 1/día).

- **Del 9 al 18 (Segundo mes):**

- Aceite de Ricino: dos cucharadas soperas en ayunas. Suprimir en caso de diarrea continua.

- Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con comidas.

- Infusión de Epazote (Chenopodium Ambrosioides): Hervir 1 o 2 cucharadas de hojas en 1 litro de agua durante 10 minutos, dejar reposar y colar. Beber 1 taza en ayunas durante 3 días.

- El resto de los días en ayunas tomar el gel de Aloe Vera, con zumo o agua.

- Enemas de la manera más continuada posible (máx 1/día).

- **Del 9 al 18 (Tercer mes):**

- Aceite de Ricino: dos cucharadas soperas en ayunas. Suprimir en caso de diarrea continua.

- Tierras de diatomeas: 2 veces al día. Una cucharadita de postre con comidas.

- Infusión de Neem (Azadirachta Indica) Tres cucharaditas rasas de té en un litro de agua. Hervir durante 5 minutos e ir tomando durante el día.
- Enemas de la manera más continuada posible (máx 1/día).

Precauciones

1. En este protocolo NO se utilizan medicamentos antiparasitarios sistémicos, que son absorbidos por el cuerpo. Ha sido diseñado para poder ser utilizado en niños, sin causar una carga tóxica excesiva.
2. En caso de que la infestación de parásitos se encontrase en la sangre, sería más conveniente el uso de un Zapper (como el Biotrohn) o visitar a un médico para usar medicamentos sistémicos.
3. No usar DMSO en los enemas, ya que haría penetrar todas las toxinas y patógenos del intestino, directamente en la sangre.
4. El aceite de ricino se utiliza como un purgante natural, para evitar una obstrucción intestinal en caso de eliminar gran cantidad de parásitos.
5. NUNCA tomar mebendazol si se está tomando Flagyl, que es metronidazol. Ya que ambos causan GRAVES interacciones.

Importante

- Este protocolo se inicia durante la luna llena, ya que suele coincidir con el ciclo reproductivo de los parásitos.
- En caso de no haber buena tolerancia al aceite de ricino puede sustituirse por sales de Epsom o por hojas del sen, que también son purgantes.
- Las infusiones de Neem pueden sustituirse por cápsulas de Neem, que tienen menos sabor.
- Si se tuviera picor anal, se puede usar una pera-lavativa con mebendazol: 10 o 15 ml de medicamento + 30 ml de agua y retenerlo toda la noche.

- Si después del tercer mes todavía están saliendo parásitos o grandes cantidades de mucosidades, se puede seguir con el protocolo empezando desde el primer mes otra vez.